N.A.P. Modul II

- Halswirbelsäule
- Brustwirbelsäule
- Obere Extremität
- Kiefergelenk

renata horst
MSc • PHYSICAL THERAPIST
www.renatahorst.de

N.A.P.-Akademie
Weiterbildungsinstitut Ingelheim
sekretariat@nap-akademie.de

© N.A.P.-Akademie 2018

N.A.P.-Akademie

N.A.P.-Akademie Berlin
Weiterbildung und Privatpraxis
Rückerstr. 6/Ecke Linienstraße
10119 Berlin

N.A.P.-Akademie Ingelheim
Weiterbildung und Privatpraxis
Stiegelgasse 40
55218 Ingelheim

Sekretariat: www.renatahorst.de, sekretariat@nap-akademie.de

© N.A.P.-Akademie 2018

LERNPROZESS

© N.A.P.-Akademie 2018

Evidenzbasierte Praxis

Was es ist:

- „Evidenzbasierte Medizin ist die bewusste, explizite und überlegte Anwendung zeitgemäßer Evidenz, um Entscheidungen zur Fürsorge von individuellen Patienten zu treffen. Die Praxis der evidenzbasierten Medizin beinhaltet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestmöglichen externen klinischen Evidenz aus der systematischen Forschung.“

© N.A.P.-Akademie 2018 Sackett 1996

Evidenzbasierte Praxis

Was es nicht ist:

- „Evidenzbasierte Medizin ist nicht auf randomisierte Kontrollen und Metaanalysen begrenzt. Sie beinhaltet die Suche nach der besten externen Evidenz, um unsere klinischen Fragen zu beantworten.“

© N.A.P.-Akademie 2018 Sackett 1996

Körperstrukturen und -funktionen werden durch Gebrauch geformt

Labels in the left diagram:

- Lateraler corticospinaler Trakt
- Vorderhornzellen für distale Muskulatur
- Vorderhornzellen für proximale Muskulatur
- Anteriorer corticospinaler Trakt

Labels in the right diagram:

- motorische Kerne
- kurze präposteriore Interneurone
- distale Versorgungs-Verzweigung
- proximale Versorgungs-Verzweigung
- distolaterale motorische Kerne
- ventromediale motorische Kerne

© N.A.P.-Akademie 2018 nach Ghez & Krakauer 2000, Gray 1919

Organisation von Bewegungsmustern

WOHIN MAN BEWEGT

↓

WIRD CORTICAL ORGANISIERT

WIE MAN BEWEGT

↓

WIRD SUBCORTICAL ORGANISIERT

→ Funktionelle Synergien werden vor der Bewegungsinitiierung organisiert.

© N.A.P.-Akademie 2018 nach Brooks 1986

Therapieziel ist Habituation → Stimulation von Mechanorezeptoren

<p>Typ I + II</p> <ul style="list-style-type: none"> Muskelspindeln Golgiorgane Pacini-Körper (Unterhautfettgewebe, Gelenkkapseln) Ruffinikörper (tiefere Hautschichten, Gelenkkapseln) <p>Typ III + IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Interstitielle myofasziale Gewebsrezeptoren 	<ul style="list-style-type: none"> Dehnungsrezeptoren Spannungsveränderungen Längeveränderungen Vibrationen Gelenkbewegung/-stellung Lang-anhaltende Druckreize Druck-/Zugveränderungen Senkung Sympathikotonus
---	---

© N.A.P.-Akademie 2018 Sató & Schmitt 1973, Mitchell & Schmidt 1977

- ### Neuroorthopädische Aktivitätsabhängige Plastizität (N.A.P.®)
- Integrativer neuroorthopädischer Therapieprozess zur Förderung von motorischen Strategien im Alltag.
 - Strukturen werden durch Aktivitäten geformt.
 - Jede Struktur ist nur so belastbar wie sie belastet wird.
 - Biomechanische und neurophysiologische Vorgänge beeinflussen sich gegenseitig.
- © N.A.P.-Akademie 2018

- ### Therapiemethoden
- **Längszug**
 - für Strukturen die exzentrisch arbeiten müssen um posturale Kontrolle zu gewährleisten und
 - um Mechanorezeptoren zu stimulieren, die zur Senkung des Sympathikotonus führen.
 - **Intermittierende Druckreize**
 - auf Strukturen, die reziprok gehemmt werden,
 - während antagonistischer Willkürmotorik.
- © N.A.P.-Akademie 2018

Triphasische Muskelaktivierung

- Automatisches Programm für schnelle zielorientierte Willküraktivitäten.
- Benötigt Feedforward.

© N.A.P.-Akademie 2018 Beradelli et al. 1996

Reziproke Innervation ist aufgabenspezifisch

- Welches motorische Programm gesteuert wird, hängt von der Intention ab.

© N.A.P.-Akademie 2018 Ghez & Krakauer 2000

Reziproke Innervation ist aufgabenspezifisch

- Wenn Stabilität das Ziel ist, dann wird Kokontraktion programmiert.

© N.A.P.-Akademie 2018 Ghez & Krakauer 2000

Plastizität

- Jede periphere Verletzung oder Erkrankung führt zu zentralen Veränderungen.
- Jede zentrale Verletzung oder Erkrankung führt zu peripheren Veränderungen.
- dies ermöglicht funktionelle Adaption auf Aktivitäts- und Partizipationsebene.
- ist oft hinderlich für Körperstrukturen.

© N.A.P.-Akademie 2018

Schutzmechanismen und Schmerzwahrnehmung

- Akute Wundheilungsphase → sinnvoller Schutz der Körperstrukturen.
- Wenn das Schutzprogramm länger aufrecht erhalten wird, als es für den Heilungsprozess erforderlich ist, folgt:
 - zunehmender Verlust der posturalen Kontrolle.
 - zunehmende strukturelle Schädigung.

© N.A.P.-Akademie 2018

Furcht führt zu automatisch gesteuerten Schutzprogrammen

© N.A.P.-Akademie 2018 LeDoux 1999

Hormonelle/biochemische Veränderungen

- Adrenalin ↑
- Noradrenalin ↑
- Cortisol ↑
- Serotonin ↑
- Schmerzmediatoren ↑

© N.A.P.-Akademie 2018

Veränderungen in der Muskelkoordination

- Tonische Muskeln ↑
- Phasische Muskeln ↓

Veränderungen der Durchblutung:

- O₂ ↓
- CO₂ ↑

© N.A.P.-Akademie 2018

Veränderungen im Bindegewebe

- Hyaluronsäurekonzentration ↓
- Matrixproduktion ↓
- Myofibroblastenkontraktion ↑

© N.A.P.-Akademie 2018

Kortikale Plastizität

- Repräsentation ist aktivitätsabhängig und mosaikartig.
- Für das Lernen von neuen Fertigkeiten werden viele Areale aktiviert

© N.A.P.-Akademie 2018 Graziano 2001

Kortikale Plastizität

- Repräsentation ist aktivitätsabhängig und mosaikartig.
- Für das Lernen von neuen Fertigkeiten werden viele Areale aktiviert

© N.A.P.-Akademie 2018 Penfield 1954, Graziano 2001

Plastizität

© N.A.P.-Akademie 2018 Ramachandran 1999

Veränderung

- Unterliegt einem Lernprozess.
- Das neurologische Substrat für das Lernen ist **PLASTIZITÄT**
- „Organic matter, especially nervous tissue, seems endowed with a very extraordinary degree of plasticity.”

© N.A.P.-Akademie 2018 James 1890

Charakteristika der N.A.P.-Therapie

- Das Üben von Aktivitäten, nicht von Bewegungen, führt zu Veränderungen der Repräsentation.
- Inputs werden situativ, zur Förderung der Handlungsorganisation, genutzt.
- Therapeutenhände stellen während der Willkürhandlung die, im Rahmen der individuellen Potenziale, erforderliche biomechanische Situation her.

© N.A.P.-Akademie 2018

Philosophie

- Strukturelle Verletzungen führen zu funktionellen Adaptionen, die mit Schutzprogrammen einhergehen.
- Das Erleben von erfolgreichen Handlungsstrategien führt zur Löschung der Schutzprogramme und ermöglicht erneuten Zugang zu den genetisch angelegten motorischen Programmen.
- Funktionelle Aktivitäten bestimmen Körperfunktionen und formen Körperstrukturen.

© N.A.P.-Akademie 2018

Kortikale Repräsentation

The diagram illustrates cortical representation. On the left, a cross-section of the brain shows Area 3b (Körper) and Area 1 (Gesicht) with sub-regions D5, D4, D3, D2, and D1. On the right, a hand diagram shows cortical areas for fingers (1-5) and palm (1-5) before and after stimulation. The 'nach Stimulation' diagram shows a significant reduction in the cortical area for the thumb (1) and index finger (2).

→ Wiederholter Gebrauch von dominanten Körperteilen führt zum Repräsentationsverlust der schwachen Körperteile.

© N.A.P.-Akademie 2018 Merzenich et al. 1983

Synaptische Plastizität

The diagram shows two stars representing stimuli. The left star is labeled 'A = konditionierter Stimulus' and 'B = unkonditionierter Stimulus'. An arrow labeled 'Repetition + Training' points from the left star to the right star, which is labeled 'A = konditionierter Stimulus'. This illustrates the process of conditioning through repeated training.

© N.A.P.-Akademie 2018

Warum kompensatorische Skoliose?

- 70% des propriozeptiven Feedbacks wird durch die Stellung der oberen Kopfgelenke, HWS und Kiefergelenke erzeugt.
- Hievon sind 45% dem Kiefergelenk zuzuordnen.

© N.A.P.-Akademie 2018 Schupp 2000, Stute & Cross 1991

Fallbeispiel: spastischer Anterocollis

© N.A.P.-Akademie 2018

N. hypoglossus (XII)

© N.A.P.-Akademie 2018

Grundprinzipien der Mobilisation der nicht-kontraktile Strukturen

- Niemals Schmerzen auslösen
- Nicht über hypermobile Gelenke bewegen
- Mehr „bewegen“ statt „dehnen“
- Zuerst proximal mobilisieren, dann evtl. distal
- Neurale Strukturen können unter Vorspannung gebracht und Bewegungen fern vom Ort der Symptome durchgeführt werden

© N.A.P.-Akademie 2018

Stabilisatoren Halswirbelsäule

© N.A.P.-Akademie 2018

Mundschliesser

© N.A.P.-Akademie 2018

N A P A
GRAPHIK-DEUTSCH

Fortgeleiteter Schmerz

A B C D

© N.A.P.-Akademie 2018

N A P A
GRAPHIK-DEUTSCH

Aktionsmassage: M. masseter

Ziele: präaktive Stabilisation HWS,
Extension CTÜ

© N.A.P.-Akademie 2018

N A P A
GRAPHIK-DEUTSCH

Fallbeispiel: Halsrippe

© N.A.P.-Akademie 2018

Erhöhter Sympathikotonus

© N.A.P.-Akademie 2018

Test und Therapie: Kraft der Zunge im Seitenvergleich

© N.A.P.-Akademie 2018

Zungenaktivität, Ziel: präaktive Stabilisation Halswirbelsäule

© N.A.P.-Akademie 2018

Mandibula-Protraktion/-Laterotrusion,
Ziel: präaktive Stabilisation HWS

© N.A.P.-Akademie 2018

The image shows a woman in a black tank top performing a mandibular protrusion exercise. She is holding a small white object (possibly a dental wax or a small piece of paper) between her teeth, pushing her lower jaw forward. Her hands are positioned near her chin to guide the movement.

Ventrale Halsmuskulatur

© N.A.P.-Akademie 2018

The diagram illustrates the ventral neck muscles. It shows the skeletal structure of the neck and upper chest, with various muscles highlighted in orange. Labels include 'Symphysis' at the top, 'Sternum' at the bottom, and 'Scapula' on the side. The muscles shown include the sternocleidomastoid, thyrohyoid, and other deep neck muscles.

Keine Handfunktion

© N.A.P.-Akademie 2018

The image shows a woman in an orange tank top sitting at a table. Her hands are resting on the table surface, and she appears to be in a relaxed or neutral position. The background shows a clinical or laboratory setting with a red mat on the floor.

Potenziale feststellen

© N.A.P.-Akademie 2018

Strukturell vs. Aktivität

© N.A.P.-Akademie 2018

Partizipationsebene

© N.A.P.-Akademie 2018

GRAPHIC USER INTERFACE

Hallo :-)

7. Juni 2012 14:49

Hallo Renata,

ich hoffe, dass es dir gut geht?

Ich war 2006 wegen meiner Fallhand bei dir in Behandlung, sowie 2008 wo ich meinen Fuß nicht mehr bewegen konnte.

Wir waren am Anfang in Hannover durch....., und dann auch in Berlin und in Ingelheim

Ich wollte dir nur mitteilen, dass alles wieder super geworden ist, als ob ich nie etwas hatte.

Hoffe das du noch weiter so viele gute Physiotherapeuten ausbilst, die dieses auch von dir lernen.

Viele liebe Grüße

E.L.

© N.A.P.-Akademie 2018

Plexus-Parese

- 36 jähriger selbstständiger, rechtshändiger Zahnarzt
- 3 Monate nach Verkehrsunfall 12/06
- Keine Schulter- und Ellenbogenfunktion
- Hand- und Fingerfunktion + Sensibilität vorhanden

N.A.P.-Akademie 2017

© N.A.P.-Akademie 2018

Videos: biceps (März, Juli, August, November)

© N.A.P.-Akademie 2018

Eigenmobilisation der kontraktiven und nicht-kontraktiven Strukturen (N. musculocutaneus)

N.A.P.-Akademie 2017

© N.A.P.-Akademie 2018

Mobilisation: Handgelenk und Daumensattelgelenk

© N.A.P.-Akademie 2018

Supination: distales und proximales Radioulnargelenk

© N.A.P.-Akademie 2018

Mobilisation: Ellenbogenflexion

© N.A.P.-Akademie 2018

Mobilisation: Ellenbogenextension/
Schulterflexion: Aktionsmassage M. latissimus
dorsi + M. teres minor

© N.A.P.-Akademie 2018

Ligamente der oberen
Halswirbelsäule

© N.A.P.-Akademie 2018

Test: Rotation C1/C2

- Fixation unterer HWS:
Links Seitneigung
führt zu links Rotation
unterhalb von C2.
- Th: stabilisiert C2.
- Patientin schaut nach
rechts oben.
- Die Rotation nach
rechts wird von der
Th. begleitet.

© N.A.P.-Akademie 2018

Test: Rotation cervikothorakaler Übergang

Rotation C7/Th1:

- Th. stabilisiert kaudalen Processus spinosus von links, während die Patientin nach rechts schaut.
- Therapeut begleitet cranialen Processus spinosus nach links.

© N.A.P.-Akademie 2018

Ziel: Mobilisation des cervicothorakalen Übergangs

Von caudal: Therapeut stabilisiert oberes Segment durch Druck von lateral; Patient rotiert unteren Wirbel durch Druck der Hand nach ventral-caudal in Richtung Knie → Rechtsrotation des oberen Segments.

© N.A.P.-Akademie 2018

Arbeitsblatt: Schwindel

© N.A.P.-Akademie 2018

Test und Mobilisation kontraktile und nicht-kontraktile Strukturen

- Ausatmung auf „L“
- Mobilisation N. vagus
- Elastizitätsförderung infrahyoidaler Muskulatur (M. omohyoideus venter superior)

© N.A.P.-Akademie 2018

The photograph shows a person lying on their back with their head on a pillow. A hand is placed on the side of the neck, just below the larynx, demonstrating a manual therapy technique. The text to the right lists the components of this technique: breathing on the letter 'L', mobilization of the vagus nerve, and promotion of elasticity in the infrahyoid muscles, specifically the upper part of the omohyoid muscle.

M. omohyoideus: Längszug

© N.A.P.-Akademie 2018

The photograph shows a person lying on their back with their head on a pillow. A hand is placed on the side of the neck, demonstrating a longitudinal pull technique on the omohyoid muscle. The text above the image indicates this is a longitudinal pull of the M. omohyoideus.

M. omohyoideus:
intermittierende Druckreize

© N.A.P.-Akademie 2018

Kiefergelenk

© N.A.P.-Akademie 2018

Mundöffner

© N.A.P.-Akademie 2018

N A P A
CHANCE FÜR BESSERES

Biomechanische Zusammenhänge

© N.A.P.-Akademie 2018 Hochschild 2019

N A P A
CHANCE FÜR BESSERES

Traktion Kiefergelenk

© N.A.P.-Akademie 2018

N A P A
CHANCE FÜR BESSERES

Traktion Kiefergelenk

© N.A.P.-Akademie 2018

Fallbeispiel: „Kalkschulter“

© N.A.P.-Akademie 2018

Aktionsmassage M. pectoralis minor und M. supraspinatus während Innenrotationsaktivität

© N.A.P.-Akademie 2018

Fallbeispiel: traumatische Schulterluxation

© N.A.P.-Akademie 2018

N A P A
CHANGEMETHODEN

Aktionsmassage: M. supraspinatus und M. pectoralis minor

© N.A.P.-Akademie 2018

N A P A
CHANGEMETHODEN

Ziel: Dekompression des AC-Gelenkes durch Dorsalrotation der Clavicula und Kaudalisierung des Angulus superior scapulae

© N.A.P.-Akademie 2018

N A P A
CHANGEMETHODEN

Präaktive Schulterstabilisation: EMG v. M. supraspinatus: -0,102 S. vor Schulterabduktion (Wikham et al. 2010)

Bei Zunahme der Kapselspannung feuert die Rotatorenmanschette → afferente Funktion des N. axillares (Guanche 1995)

© N.A.P.-Akademie 2018

Schultertape reduzierte EMG-Aktivität des M. trapezius, p. descendens und erhöhte des p. ascendens (Selkowitz et al. 2007)

© N.A.P.-Akademie 2018

The image shows two women in a clinical or research setting. One woman, wearing a white t-shirt, is applying a piece of tape to the shoulder of another woman who is wearing a grey sports bra. The second woman has several pieces of tape already applied to her upper back and shoulder area. The background is a plain, light-colored wall.